



ÅTGÄRDER VID SMITTSAM SJUKDOM I STALLET

När smitta brutit ut i stallet, gör följande åtgärder för att minska smittspridningen:

- ✓ Isolera omedelbart sjuka hästar från friska hästar, även utomhus.
- ✓ Isolera också de hästar som kan ha blivit smittade genom direktkontakt, om olika grupper kan hållas.
- ✓ Veterinär ska inom kort undersöka de sjuka hästarna för rätt diagnos, behandling och rådgivning.
- ✓ För veterinära frågor och åtgärder, utse en ledare som koordinerar dessa frågor.
- ✓ Informera samtliga som arbetar och vistas på anläggningen, om det uppkomna läget.
- ✓ Använd varmt vatten, tvål, ren handduk och handdesinfektion till handtvätt.
- ✓ Personal som sköter de sjuka hästarna ska använda särskilda kläder; skyddskläder, skoskydd och engångshandskar.
- ✓ Organisera daglig temperaturregistrering av samtliga hästar i stallet.
- ✓ Använd olika redskap och utrustning till sjuka och friska hästar.
- ✓ Innan och efter sårvård; tvätta händerna med tvål och vatten och använd en ren handduk eller pappershanddukar samt använd även handdesinfektion.
- ✓ Ta inte emot nya hästar till anläggningen.
- ✓ När smittan lagt sig. Rengör först stallet mekaniskt och därefter desinficera stallet, redskap, utrustning och hästtransport.

LÄS MER: hastsverige.se | sva.se | jordbruksverket.se

#SMITTFRITTSTALL